



HERBICIDA

MURO
WDG



Nutrien
Ag Solutions™

HERBICIDA

MURO
WDG

GRUPO: B
GRÁNULOS DISPERSABLES

Composición:

clorimuron-etil: etil 2 -[(((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino)carbonil)amino) sulfonil]benzoato	25 g
inertes: c.s.p.	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 37.775

Lote N°: Ver envase

Fecha de Vencimiento:
Ver envase

PRODUCTO
NO INFLAMABLE

Cont. Neto:
300 g

Nutrien
Ag Solutions™

Registrado por:

Nutrien Ag Solutions Argentina S.A.

Dardo Rocha 3278

B1640FTX Martinez - Argentina

TE: (011) 4717-4555

Origen: China

www.nutrienagsolutions.com.ar

FRENTE

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Clase toxicológica (OMS 2009): III - Ligeramente Peligroso. Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. Toxicidad inhalatoria: Categoría II (NOCIVO). Grupo químico: sulfonilureas. No tiene antidoto específico. No contiene solventes. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

- Hospital Pedro de Elizalde: Av. M. de Oca 40 Cap. Fed. Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842.
- Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804.
- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia s/n Palomar, Bs. As. Tel.: 0800-333-0160.
- Tel (011) 4658-7777/4654-6648.

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No esperable

IMPORTANTE: LA EMPRESA ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, LA EMPRESA no se responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

CUIDADO

DORSO

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel, ojos y ropa, puede causar irritación. No aspirar la neblina de la pulverización. Durante la manipulación y aplicación usar protector facial, guantes y botas y no comer, beber o fumar durante la misma.

RIESGOS AMBIENTALES: Peces: Prácticamente no tóxico. Aves: Prácticamente no tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico. No asperjar sobre colmenas en actividad.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Los remanentes de caldo de aplicación deberán ser asperjados en alambrados o zonas no cultivables evitando contaminar cursos de agua lejos de lugares con tránsito frecuente de personas o animales domésticos.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Practicar la técnica del triple lavado. Una vez vacíos, inutilizarlos por perforación y colocarlos en tambores o contenedores, en lugar seguro hasta su traslado a Centros autorizados que efectuaran la disposición final. No quemar a cielo abierto.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, seco y bajo llave, lejos del hogar, en su envase original cerrado y protegido de la luz solar directa. Mantener alejado de otros pesticidas.

DERRAMES: Barrer y recoger el residuo en material inerte acidificado, luego colocarlo en contenedores para su posterior traslado a una planta de tratamiento para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón. Si el producto ingresó a los ojos lavar con agua corriente y limpia al menos durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de inhalación, sacar al afectado al aire fresco. En caso de ingestión, provocar el vómito con agua tibia. Seguir con tratamiento sintomático. En todos los casos, llamar inmediatamente al médico o acudir a un centro asistencial, llevando copia de esta etiqueta.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio, lagrimeo, afecciones respiratorias como catarro y tos, náusea, vómitos y diarrea.

GENERALIDADES: MURO WDG es un herbicida sistémico, selectivo y postemergente para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos de soja y alfalfa. MURO WDG luego de ser absorbido por las hojas y raíces de las malezas, se transloca por toda la planta rápidamente, produciendo clorosis en el follaje a los 3-5 días y finalmente la muerte de la maleza a los 7-20 días de la aplicación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Llenar el tanque de la aplicadora hasta la mitad de su capacidad, agregar luego la cantidad necesaria del producto según la dosis y el área a tratar, con los agitadores en marcha. Por último añadir un surfactante no iónico y completar el llenado del tanque. Asegurar una solución homogénea mediante un buen agitado antes de la aplicación.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados con un volumen de 100-120 l/ha. Con avión con un volumen de 15-20 l/ha. Aplicar con boquillas de abanico plano, presión de 40 lbs/pulg². Se recomienda especialmente calibrar bien la aplicadora.

Limpieza de la pulverizadora: Debido a la actividad de este producto aún en muy bajas dosis, es importante eliminar los remanentes del mismo en el equipo luego de la aplicación. **Procedimiento:** drenar el tanque y lavar con agua a presión, hacer lo mismo con las mangueras y picos. En las pulverizadoras terrestres agregar en el enjuague 0,5 l de lavandina cada 100 litros de agua. Esta solución debe circular también por las mangueras y picos durante 15 minutos. Esta operación debe repetirse dos veces.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo de soja: Maleza que controla: Abrojo grande (Xanthim cavanillesii), Bejuco (Ipomaea spp), Chamico (Datura ferox) Nabo (Brassica campestris), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis), Chinchillas (Tajetes minuta), Saetilla (Bidens pilosa.) Dosis: 40-60 g/ha.

Momento de aplicación: en post-emergencia de la soja y la maleza. La soja, a partir de la primera hoja trifoliada abierta hasta 60 días antes de la madurez. Las malezas cuando tengan por lo menos de 2-5 hojas verdaderas y estén en activo crecimiento. Importante: la dosis mayor puede producir fitotoxicidad temporaria (detención del crecimiento y clorosis en el follaje), pero no afectará el rendimiento final. Para el control del bejuco agregar 50 cm³ / ha de 2,4 DB 100%.

Importante: no aplicar si se esperan lluvias inmediatas,

dentro de las 4 horas de aplicación. No aplicar con vientos mayores de 5 a 8 km/hora. No aplicar en suelos con pH > 7,0, debido a que el producto tendría una residualidad mayor que afectaría a los cultivos siguientes. No drenar ni limpiar cerca de cultivos deseables, pues puede dañarlos.

Cultivo de alfalfa:

Malezas que controla: Nabón (*Raphanus sativus*), Mostacilla (*Rapistrum rugosum*) Falsa biznaga (*Ammis majus*), Manzanilla cimarrona (*Matricaria chamomilla*), Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule*), Ortiga (*Urtica urens*), Masturezo (*Coronopus didymus*), Nabo (*Brassica campestris*), Lengua de vaca (*Rumex crispus*). Dosis: 20-30 g/ha

Momento de aplicación: En post-emergencia del cultivo y la maleza. La alfalfa cuando tenga 3 hojas trifoliadas. Las malezas cuando tengan de 2 - 5 hojas verdaderas y estén en activo crecimiento. Importante: puede presentar detención temporaria del crecimiento, pero no afectará el futuro de la pradera.

RESTRICCIONES DE USO: Período entre la aplicación y cosecha o pastoreo: soja 60 días, alfalfa 30 días. "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados, excepto con los de reacción alcalina. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque con otro producto, se deberá hacer una prueba previa a fin de demostrar eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados.

FITOTOXICIDAD: No presenta siguiendo exactamente las indicaciones del marbete.

Nota: Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos susceptibles. Se recomienda lavar siempre muy bien el tanque del equipo pulverizador antes y después de usar el producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.



CUIDADO

